

Locatienr **Ld07-Ld08** ter hoogte van Elisadonk 244-248

Hier treft u de plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan. Beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting. Niet alle plantvakken komen in aanmerking.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak u een keuze kunt maken.

[Dit kan voor plantvakken met nummer: Ld07 en Ld08](#)

Onderaan dit bestand kunt u uw voorkeur doorgeven via de knop "uw keuze doorgeven".



Uw keuze voor plantvak met nummer Ld07

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Hs-mix 3

Heester-mix 3

A

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Hs-mix 2

Heester-mix 2

B

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Hs-mix 4

Heester-mix 4

C

zie voor kenmerken van de soorten van de heester-mix op de volgende pagina's

Uw keuze voor plantvak met nummer Ld08

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Hs-mix 1

Heester-mix 1

A

*zie voor kenmerken van de
soorten van de heester-mix
op de volgende pagina's*

Hs-mix 4

Heester-mix 4

B

*zie voor kenmerken van de
soorten van de heester-mix
op de volgende pagina's*

Hs-mix 3

Heester-mix 3

C

*zie voor kenmerken van de
soorten van de heester-mix
op de volgende pagina's*

Uw voorkeur doorgeven voor de plantkeuze

uw keuze doorgeven

Werkt de knop niet? Gebruik dan de volgende URL: www.roosendaal.nl/versleten-groen

Acecamp	<i>latijnse naam</i>	Acer campestre
	<i>nederl. naam</i>	Spaanse aak, Veldesdoorn
	<i>bloeitijd</i>	mei-juni
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	15 m
	<i>percentage</i>	10%



EscDoSe	<i>latijnse naam</i>	Escallonia 'Donard Seedling'
	<i>nederl. naam</i>	-
	<i>bloeitijd</i>	juni
	<i>kleur</i>	roze
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,5 m
	<i>percentage</i>	10%



Lonpil	<i>latijnse naam</i>	Lonicera pileata
	<i>nederl. naam</i>	Struikkamperfoelie
	<i>bloeitijd</i>	mei
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1 m
	<i>percentage</i>	30%



LontatArR	<i>latijnse naam</i>	Lonicera tatarica 'Arnold Red'
	<i>nederl. naam</i>	Struikkamperfoelie
	<i>bloeitijd</i>	mei-juni
	<i>kleur</i>	purperrood
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	2,5 m
	<i>percentage</i>	15%



Ribalp	<i>latijnse naam</i>	Ribes alpinum
	<i>nederl. naam</i>	Alpenbes
	<i>bloeitijd</i>	juni
	<i>kleur</i>	geelgroen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,8 m
	<i>percentage</i>	15%



SymcheHa	<i>latijnse naam</i>	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
	<i>nederl. naam</i>	Sneeuwbes
	<i>bloeitijd</i>	juni-juli
	<i>kleur</i>	roze
	<i>bijzonderheden</i>	purperroze bes
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	20%



HydarbAn	<i>latijnse naam</i>	Hydrangea arborescens 'Annabel'
	<i>nederl. naam</i>	Hortensia
	<i>bloeitijd</i>	juli-sept
	<i>kleur</i>	crème
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,25 m
	<i>percentage</i>	20%



Ligvul	<i>latijnse naam</i>	Ligustrum tschonoskii 'Little Thomas'
	<i>nederl. naam</i>	Liguster
	<i>bloeitijd</i>	mei-juni
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	zwarte bes
	<i>hoogte</i>	1,25 m
	<i>percentage</i>	15%



Lonpil	<i>latijnse naam</i>	Lonicera pileata
	<i>nederl. naam</i>	Struikkamperfoelie
	<i>bloeitijd</i>	mei
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1 m
	<i>percentage</i>	20%



Roscan	<i>latijnse naam</i>	Rosa canina
	<i>nederl. naam</i>	Hondsroos
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept
	<i>kleur</i>	zachtroze
	<i>bijzonderheden</i>	bottels
	<i>hoogte</i>	2 m
	<i>percentage</i>	20%



SpicinGr	<i>latijnse naam</i>	Spiraea cinerea 'Grefsheim'
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	april-mei
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,8 m
	<i>percentage</i>	10%



SpijapAnW	<i>latijnse naam</i>	Spiraea japonica 'Anthony Waterer'
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	juni-aug
	<i>kleur</i>	rozerood
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	15%



BuddavBIC	<i>latijnse naam</i>	Buddleja davidii 'Blue Chip'
	<i>nederl. naam</i>	Vlinderstruik
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept
	<i>kleur</i>	paarsblauw
	<i>bijzonderheden</i>	bijen/vlinders
	<i>hoogte</i>	0,6 m
	<i>percentage</i>	30%
DeuStF	<i>latijnse naam</i>	Deutzia hybrida 'Strawberry Fields'
	<i>nederl. naam</i>	Bruidsbloem
	<i>bloeitijd</i>	april-mei
	<i>kleur</i>	donkerroze
	<i>bijzonderheden</i>	rijkbloeiend
	<i>hoogte</i>	1,5 m
	<i>percentage</i>	10%
HedhelAr	<i>latijnse naam</i>	Hedera helix 'Arborescent Group'
	<i>nederl. naam</i>	Klimop
	<i>bloeitijd</i>	sept-okt
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen
	<i>hoogte</i>	1 m
	<i>percentage</i>	20%
Lonpil	<i>latijnse naam</i>	Lonicera pileata
	<i>nederl. naam</i>	Struikkamperfoelie
	<i>bloeitijd</i>	mei
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1 m
	<i>percentage</i>	20%
Roscan	<i>latijnse naam</i>	Rosa canina
	<i>nederl. naam</i>	Hondsroos
	<i>bloeitijd</i>	juni-sept
	<i>kleur</i>	zachtroze
	<i>bijzonderheden</i>	bottels
	<i>hoogte</i>	2 m
	<i>percentage</i>	10%
SpijapGe	<i>latijnse naam</i>	Spiraea japonica 'Genpei' (Shirobana)
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	juni-aug
	<i>kleur</i>	donkerroze en wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	10%



HedhelAr	<i>latijnse naam</i>	Hedera helix 'Arborescent Group'
	<i>nederl. naam</i>	Klimop
	<i>bloeitijd</i>	sept-okt
	<i>kleur</i>	groen
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen
	<i>hoogte</i>	1 m
	<i>percentage</i>	20%



PrulauAt	<i>latijnse naam</i>	Prunus laurocerasus 'Athene'
	<i>nederl. naam</i>	Gewone Laurierkers
	<i>bloeitijd</i>	mei en sept
	<i>kleur</i>	wit
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen
	<i>hoogte</i>	1,5 m
	<i>percentage</i>	5%



Ribalp	<i>latijnse naam</i>	Ribes alpinum
	<i>nederl. naam</i>	Alpenbes
	<i>bloeitijd</i>	juni
	<i>kleur</i>	geelgroen
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	1,8 m
	<i>percentage</i>	20%



RosRu	<i>latijnse naam</i>	Rosa 'Rugby'
	<i>nederl. naam</i>	Roos
	<i>bloeitijd</i>	mei-okt
	<i>kleur</i>	wit-geel hart
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	30%



SpijapGe	<i>latijnse naam</i>	Spiraea japonica 'Genpei' (Shirobana)
	<i>nederl. naam</i>	Spierstruik
	<i>bloeitijd</i>	juni-aug
	<i>kleur</i>	donkerroze en wit
	<i>bijzonderheden</i>	-
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	10%



SymcheHa	<i>latijnse naam</i>	Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'
	<i>nederl. naam</i>	Sneeuwbes
	<i>bloeitijd</i>	juni-juli
	<i>kleur</i>	roze
	<i>bijzonderheden</i>	purperroze bes
	<i>hoogte</i>	0,8 m
	<i>percentage</i>	15%

