


Locatienr **Ld01-03** ter hoogte van Alexanderdonk 18-50

Hier treft u de plantkeuze voor beplanting voor uw plantvak aan. Beplanting wordt vervangen door nieuwe beplanting. Niet alle plantvakken komen in aanmerking.

Op de onderstaande tekening staat ingekleurd voor welke vak u een keuze kunt maken.

[Dit kan voor plantvakken met nummer: Ld01, Ld02 en Ld03](#)

Onderaan dit bestand kunt u uw voorkeur doorgeven via de knop "uw keuze doorgeven".



Uw keuze voor plantvak met nummer Ld01

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 3

Bosplantsoen mix 3 (hoog)

A

zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's

Mix 5

Bosplantsoen mix 5 (hoog)

B

zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's

Mix 2

Bosplantsoen mix 2 (laag)

C

zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's

Uw keuze voor plantvak met nummer Ld02

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 5

Bosplantsoen mix 5 (hoog)

A

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 1

Bosplantsoen mix 1 (laag)

B

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 2

Bosplantsoen mix 2 (laag)

C

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Uw keuze voor plantvak met nummer Ld03

Eerst vermelde mix heeft de voorkeur van de gemeente.

Mix 1

Bosplantsoen mix 1 (laag)

A

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 4

Bosplantsoen mix 4 (droog)

B

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Mix 2

Bosplantsoen mix 2 (laag)

C

*zie voor kenmerken van de
soorten van de bosplantsoen
mix de volgende pagina's*

Uw voorkeur doorgeven voor de plantkeuze

uw keuze doorgeven

AroarbBr	<i>latijnse naam</i> Aronia arbutifolia 'Brilliant' <i>nederl. naam</i> Appelbes <i>bloeitijd</i> april-mei <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> helderrode bes <i>hoogte</i> 1,5 m <i>percentage</i> 20%	
Cotfra	<i>latijnse naam</i> Cotoneaster franchetii <i>nederl. naam</i> Dwergmispel <i>bloeitijd</i> juni <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> halfwintergroen, bes <i>hoogte</i> 1,8 m <i>percentage</i> 20%	
LontatArR	<i>latijnse naam</i> Lonicera tatarica 'Arnold Red' <i>nederl. naam</i> Struikkamperfoelie <i>bloeitijd</i> mei-juni <i>kleur</i> purperrood <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 2,5 m <i>percentage</i> 20%	
Ligvulg	<i>latijnse naam</i> Ligustrum vulgare <i>nederl. naam</i> Gewone liguster <i>bloeitijd</i> april <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> halfwintergroen <i>hoogte</i> 2 m <i>percentage</i> 15%	
PrulauSc	<i>latijnse naam</i> Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' <i>nederl. naam</i> Gewone Laurierkers <i>bloeitijd</i> juni-juli <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> wintergroen <i>hoogte</i> 2 m <i>percentage</i> 5%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> Rosa pimpinellifolia <i>nederl. naam</i> Duinroos <i>bloeitijd</i> mei-juni <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 2,5 m <i>percentage</i> 10%	
Mesger	<i>latijnse naam</i> Mespilus germanica <i>nederl. naam</i> Mispel <i>bloeitijd</i> mei <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 4-6 m <i>percentage</i> 5%	
Rosmult	<i>latijnse naam</i> Rosa multiflora <i>nederl. naam</i> Veelbloemige roos <i>bloeitijd</i> juni-juli <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> geurend <i>hoogte</i> 3 m <i>percentage</i> 5%	

Rhafra	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rhamnus frangula Vuilboom, sporkehout mei-juli groenwit vruchtdragend 3 m 20%	
Ribnig	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Ribes nigrum Zwarte aalbes - - eetbare vruchten 1,5 m 20%	
Ligvulg	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Ligustrum vulgare Gewone liguster april wit halfwintergroen 2 m 15%	
Amelam	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Amelanchier lamarckii Krentenboompje april-mei wit vogels 6-8 m 10%	
AroarbBr	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Aronia arbutifolia 'Brilliant' Appelbes april-mei wit helderrode bes 1,5 m 10%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa pimpinellifolia Duinroos mei-juni wit - 2,5 m 10%	
Rosrub	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa rubiginosa Eglantier juni-aug rozerood - 1,5 m 10%	
Rubodo	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rubus odoratus Braam juli-aug roodpaars - 1,5 m 5%	

PrulauSc	<i>latijnse naam</i> Prunus laurocerasus 'Schipkaensis' <i>nederl. naam</i> Gewone Laurierkers <i>bloeitijd</i> juni-juli <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> wintergroen <i>hoogte</i> 2 m percentage 5%	
Rospimp	<i>latijnse naam</i> Rosa pimpinellifolia <i>nederl. naam</i> Duinroos <i>bloeitijd</i> mei-juni <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 2,5 m percentage 20%	
Cotdiv	<i>latijnse naam</i> Cotoneaster divaricatus <i>nederl. naam</i> Dwergmispel <i>bloeitijd</i> juni-juli <i>kleur</i> wit-roze <i>bijzonderheden</i> rode vruchten, talrijk <i>hoogte</i> 2 m percentage 25%	
EuoeurReC	<i>latijnse naam</i> Euonymus europaeus 'Red Cascade' <i>nederl. naam</i> Kardinaalshoed <i>bloeitijd</i> mei-juni <i>kleur</i> groen <i>bijzonderheden</i> rozerode vruchten <i>hoogte</i> 3 m percentage 20%	
Aespar	<i>latijnse naam</i> Aesculus parviflora <i>nederl. naam</i> Herfstpaardenkastanje <i>bloeitijd</i> juli-aug <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 4-6 m percentage 10%	
Amelam	<i>latijnse naam</i> Amelanchier lamarckii <i>nederl. naam</i> Krentenboompje <i>bloeitijd</i> april-mei <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> vogels <i>hoogte</i> 6-8 m percentage 10%	
Acecamp	<i>latijnse naam</i> Acer campestre <i>nederl. naam</i> Spaanse aak, Veldesdoorn <i>bloeitijd</i> mei-juni <i>kleur</i> groen <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 6-8 m percentage 5%	
Mesger	<i>latijnse naam</i> Mespilus germanica <i>nederl. naam</i> Mispel <i>bloeitijd</i> mei <i>kleur</i> wit <i>bijzonderheden</i> - <i>hoogte</i> 4-6 m percentage 5%	

Amelam	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Amelanchier lamarckii Krentenboompje april-mei wit vogels 6-8 m 20%
Rosmult	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa multiflora Veelbloemige roos juni-juli wit geurend 3 m 20%
Rospimp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rosa pimpinellifolia Duinroos mei-juni wit - 2,5 m 20%
Mesger	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Mespilus germanica Mispel mei wit - 4-6 m 15%
Acecamp	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Acer campestre Spaanse aak, Veldesdoorn mei-juni groen - 6-8 m 10%
Rhafra	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Rhamnus frangula Vuilboom, sporkehout mei-juli groenwit vruchtdragend 3 m 10%
Corave	<i>latijnse naam</i> <i>nederl. naam</i> <i>bloeitijd</i> <i>kleur</i> <i>bijzonderheden</i> <i>hoogte</i> <i>percentage</i>	Corylus avellana Hazelaar jan-april groen eetbare vruchten 6-8 m 5%



Cotfra	<i>latijnse naam</i>	Cotoneaster franchetii	
	<i>nederl. naam</i>	Dwergmispel	
	<i>bloeitijd</i>	juni	
	<i>kleur</i>	wit	
	<i>bijzonderheden</i>	halfwintergroen, bes	
	<i>hoogte</i>	1,8 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Rhafra	<i>latijnse naam</i>	Rhamnus frangula	
	<i>nederl. naam</i>	Vuilboom, sporkehout	
	<i>bloeitijd</i>	mei-juli	
	<i>kleur</i>	groenwit	
	<i>bijzonderheden</i>	vruchtdragend	
	<i>hoogte</i>	3 m	
	<i>percentage</i>	20%	
Corave	<i>latijnse naam</i>	Corylus avellana	
	<i>nederl. naam</i>	Hazelaar	
	<i>bloeitijd</i>	jan-april	
	<i>kleur</i>	groen	
	<i>bijzonderheden</i>	eetbare vruchten	
	<i>hoogte</i>	6-8 m	
	<i>percentage</i>	10%	
EuoeurReC	<i>latijnse naam</i>	Euonymus europaeus 'Red Cascade'	
	<i>nederl. naam</i>	Kardinaalshoed	
	<i>bloeitijd</i>	mei-juni	
	<i>kleur</i>	groen	
	<i>bijzonderheden</i>	rozerode vruchten	
	<i>hoogte</i>	3 m	
	<i>percentage</i>	10%	
LontatArR	<i>latijnse naam</i>	Lonicera tatarica 'Arnold Red'	
	<i>nederl. naam</i>	Struikkamperfoelie	
	<i>bloeitijd</i>	mei-juni	
	<i>kleur</i>	purperrood	
	<i>bijzonderheden</i>	-	
	<i>hoogte</i>	2,5 m	
	<i>percentage</i>	15%	
Mesger	<i>latijnse naam</i>	Mespilus germanica	
	<i>nederl. naam</i>	Mispel	
	<i>bloeitijd</i>	mei	
	<i>kleur</i>	wit	
	<i>bijzonderheden</i>	-	
	<i>hoogte</i>	4-6 m	
	<i>percentage</i>	10%	
PrulauSc	<i>latijnse naam</i>	Prunus laurocerasus 'Schipkaensis'	
	<i>nederl. naam</i>	Gewone Laurierkers	
	<i>bloeitijd</i>	juni-juli	
	<i>kleur</i>	wit	
	<i>bijzonderheden</i>	wintergroen	
	<i>hoogte</i>	2 m	
	<i>percentage</i>	5%	
Ribnig	<i>latijnse naam</i>	Ribes nigrum	
	<i>nederl. naam</i>	Zwarte aalbes	
	<i>bloeitijd</i>	-	
	<i>kleur</i>	-	
	<i>bijzonderheden</i>	eetbare vruchten	
	<i>hoogte</i>	1,5 m	
	<i>percentage</i>	10%	